

## CARBOCAL-500 Calcium Carbonate BP Tablet

### PRESENTATION :

Carbocal 500 is a tablet each containing Calcium Carbonate.

### COMPOSITION :

Each Tablet Contains Calcium Carbonate BP 1.250 gm. equivalent to 500 mg. elemental Calcium.

### USES :

It is used as a Calcium supplement in deficiency states caused by inadequate intake of Calcium in the diet due to malnutrition. When Calcium requirements are raised (Pregnancy and lactation stage) and in children and adolescents at times of rapid growth, Calcium Carbonate is used. This drug is also used in the treatment of Osteoporosis and to treat the disorders of osteogenesis and tooth formation.

### DOSAGE AND ADMINISTRATION :

One tablet daily or as directed by physician. The tablet must be swallowed.

### CONTRA-INDICATION :

Hypersensitivity to the preparation. This drug is contraindicated in hypercalcaemia, severe hypercalciuria and severe renal insufficiency.

### USES IN PREGNANCY AND LACTATION :

The drug is recommended during pregnancy and lactation.

### SIDE EFFECTS :

Few have been observed and are usually mild. In rare cases, flatulence, diarrhoea or constipation may occur.

### PRECAUTIONS :

This drug should be taken cautiously in patients with mild hypercalciuria.

### DRUG INTERACTION :

This drug can reduce the absorption of tetracycline and fluoride preparations when used concomitantly. Vitamin D increases the absorption of calcium.

### PACKAGING :

Box containing 100 Tablets in 10 x 10's Blister Strip.

Manufactured by:



GLOBE PHARMACEUTICALS LTD.  
Noakhali, Bangladesh.

## কার্বোক্যাল-৫০০

### ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বিপি ট্যাবলেট

### বর্ণনা :

কার্বোক্যাল-৫০০ একটি ট্যাবলেট যার মূল উপাদান ক্যালসিয়াম কার্বোনেট।

### উপাদান :

প্রতি ট্যাবলেটে আছে, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বিপি ১.২৫০ গ্রাম যাহা ৫০০ মি. গ্রা. এলিমেন্টাল ক্যালসিয়াম এর সমতুল্য।

### নির্দেশনা :

অপুষ্টিজনিত কারণে অথবা অপর্യാপ্ত ক্যালসিয়াম গ্রহণের ফলে অভাবজনিত অবস্থা পূরণার্থে কার্বোক্যাল-৫০০ ব্যবহৃত হয়, প্রসূতি ও স্তন্যদানরত মায়েদের ক্ষেত্রে যখন ক্যালসিয়ামের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তখন কার্বোক্যাল-৫০০ নির্দেশিত হয়ে থাকে। অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসায়ও এই ঔষধটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

### সেবন মাত্রা ও বিধি :

প্রতিদিন ১টি ট্যাবলেট অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। ট্যাবলেটটি না চুষে গিলে খেতে হবে।

### বিপরীত নির্দেশনা :

যে সমস্ত রোগীদের হাইপারক্যালসিমিয়া, তীব্র হাইপারক্যালসিউরিয়া আছে তাদের ক্ষেত্রে ঔষুধটির ব্যবহার নিষিদ্ধ।

### প্রসূতি ও স্তন্যদানরত মায়েদের ক্ষেত্রে :

প্রসূতি ও স্তন্যদানরত মায়েদের ক্ষেত্রে ঔষুধটির ব্যবহার সুপারিশযোগ্য।

### পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :

ঔষুধটি ব্যবহারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুব কমই পরিলক্ষিত হয়, হলেও মৃদু। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোষ্ঠ কাঠিন্য, ফ্লাটুলেন্স দেখা দিতে পারে।

### সাবধানতা :

যাদের মৃদু হাইপারক্যালসিউরিয়া আছে তাদের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

### ঔষুধের আন্তঃক্রিয়া :

যখন টেট্রাসাইক্লিন অথবা ফ্লোরাইড ঔষুধটির সংগে একত্রে সেবন করা হয় তখন তাদের শোষণ ব্যাহত হয়। ভিটামিন ডি ক্যালসিয়ামের শোষণ বাড়িয়ে দেয়।

### প্যাকেজিং :

প্রতি বাক্সে আছে ১০০টি ট্যাবলেটের ১০ x ১০টি ব্লিষ্টার স্ট্রিপ।

প্রস্তুতকারক:



গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ  
নোয়াখালী, বাংলাদেশ