

Cartifit

Glucosamine sulfate INN 250 mg
Chondroitin sulfate INN 200 mg

PRESENTATION : Cartifit tablet : Each film coated tablet contains Glucosamine sulfate INN 250 mg and Chondroitin sulfate INN 200 mg.

INDICATIONS : Cartifit is indicated for-

- ★ Osteoarthritis
- ★ Dietary Supplement

DOSAGE AND ADMINISTRATIONS : 1-2 tablets three times daily or as directed by the physician.

CONTRAINDICATIONS : There are no known contraindications for Glucosamine and Chondroitin. But proven hypersensitivity to these ingredients is a contraindication.

SIDE-EFFECTS : Both Glucosamine and Chondroitin sulfates are virtually nontoxic. Side effects are rare and limited to stomach upset, nausea or diarrhea. These usually disappear when the tablet is taken with meals.

PRECAUTIONS : Patients with severe hepatic or renal insufficiency should be under appropriate medical supervision while taking Glucosamine and Chondroitin albeit no special studies were formed in patients with renal and / or hepatic insufficiency.

DRUG INTERACTIONS : There have been no reports of significant drug interactions of Glucosamine with antibiotics/antidepressants/ antihypertensives/ nitrates/ antiarrhythmics/ anxiolytic/ hypoglycemic agents/anti-secretives. But in case of Chondroitin there is a chance of drug interaction with blood-thinning medications (e.g. warfarin, heparin).

USE IN PREGNANCY AND LACTATION : Women who are pregnant or who could become pregnant should not supplement with Glucosamine and Chondroitin. They have not been studied enough to determine their effects on a developing fetus, and no studies have evaluated the use of Glucosamine and Chondroitin during pregnancy or lactation. It should be taken with caution and medical advice during pregnancy and lactation.

COMMERCIAL PACK :

Cartifit Tablet : Each box contains 12 x 4 tablets in Alu-Alu blister strips.

Manufactured by:



Globe Pharmaceuticals Ltd.
Noakhali, Bangladesh.

কার্টিফিট

গ্লুকোসামিন সালফেট আই এন এন ২৫০ মিগ্রা
কনড্রয়টিন সালফেট আই এন এন ২০০ মিগ্রা

উপস্থাপন : কার্টিফিট ট্যাবলেট : প্রতিটি পাতলা আবরণযুক্ত ট্যাবলেটে রয়েছে গ্লুকোসামিন সালফেট আই এন এন ২৫০ মিগ্রা এবং কনড্রয়টিন সালফেট আই এন এন ২০০ মিগ্রা।

নির্দেশনা ও ব্যবহার :

- ★ অস্টিওআর্থ্রাইটিস এর চিকিৎসায়
- ★ সম্পূরক খাদ্য হিসাবে

সেবনমাত্রা ও বিধি : একটা অথবা দুইটা করে ট্যাবলেট দৈনিক তিনবার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

প্রতি নির্দেশনা : গ্লুকোসামিন এবং কনড্রয়টিন সালফেট এর কোনরূপ প্রতিনির্দেশনা জানা যায় নাই। তবে প্রমাণিত অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া : প্রকৃত পক্ষে গ্লুকোসামিন এবং কনড্রয়টিন সালফেট ক্ষতিকর নয়। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ঘটনা বিরল এবং তা পেটে অস্বস্তি, বমি বমি ভাব অথবা ডায়রিয়াতে সীমাবদ্ধ। ট্যাবলেটটি খাবারের সাথে খেলে এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো সাধারণত দেখা দেয় না।

সাবধানতা : যুক্ত ও বৃদ্ধে মারাত্মক রোগাক্রান্ত রোগীদের যথাযথ মেডিক্যাল সুপারভিশনে এটি দেয়া উচিত যদিও যুক্ত ও বৃদ্ধের অপর্യാপ্ততা বিশিষ্ট রোগীদের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ গবেষণা করা হয়নি।

ঔষধের আন্তঃক্রিয়া : এন্টিবায়োটিক/এন্টিডিপ্রেসেন্ট/ এন্টিহাইপারটেনসিভ/ নাইট্রেট/ এন্টিএয়ারিডমিক/ এনজিওলাইটিক/ হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট/ এন্টিসিক্রেটিভ-এর সাথে গ্লুকোসামিনের উল্লেখযোগ্য কোন ড্রাগ ইন্টারাকশন এর তথ্য পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কনড্রয়টিনের ক্ষেত্রে রক্ত পাতলাকরণ ঔষধের (যেমন : হেপারিন, ওয়ারফেরিন) সাথে ড্রাগ ইন্টারাকশনের সম্ভাবনা রয়েছে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে : গর্ভবতী ও গর্ভসম্মু মহিলাদের ক্ষেত্রে গ্লুকোসামিন ও কনড্রয়টিন সাপ্লিমেন্ট দেয়া উচিত নয়। গর্ভস্থিত শিশুর প্রতি গ্লুকোসামিন ও কনড্রয়টিন এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত যথেষ্ট পরীক্ষা চালানো হয় নাই এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে গ্লুকোসামিন ও কনড্রয়টিন ব্যবহার সম্পর্কিত কোন গবেষণা করা হয় নাই। তাই গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে বিশেষ সতর্কতার সাথে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে গ্লুকোসামিন ও কনড্রয়টিন ব্যবহার করা উচিত।

বাণিজ্যিক মোড়ক :

কার্টিফিট ট্যাবলেট : প্রতি বাল্লে আছে ১২ X ৪টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার স্ট্রীপে।

প্রস্তুতকারকঃ



গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
নোয়াখালী, বাংলাদেশ