

DESLONA (Desloratadine INN)

Presentation

Deslona Tablet Each film-coated tablet contains Desloratadine INN 5 mg.

Deslona Syrup Each 5 ml syrup contains Desloratadine INN 2.5 mg.

Description

Deslona (Desloratadine) is a potent, long-acting, non-sedative antihistamine with selective and peripheral H1-receptor antagonist activity. It is the active descarboethoxy metabolite of loratadine.

Indications & Usage

Allergic Rhinitis Deslona is indicated for the relief of the nasal and non-nasal symptoms of allergic rhinitis (Both seasonal and perennial). **Chronic Idiopathic Urticaria** Deslona is indicated for the symptomatic relief of pruritus, reduction in the number of hives, and size of hives, in patients with chronic idiopathic urticaria.

Dosage & Administration

Adults & Children 12 years of age and over

Tablet: One tablet (5 mg) once daily.
Syrup: 2 teaspoonful (10 ml) once daily.

Children 6 to 11 years of age

Syrup: 1 teaspoonful (5 ml) once daily.

Children 1 to 5 years of age

Syrup: 1/2 teaspoonful (2.5 ml) once daily.

Children 6 to 11 months of age

Syrup: 1/2 teaspoonful (2.5 ml) once daily.

Or as directed by the physician.

In adult patients with liver or renal impairment: A starting dose of one **Deslona tablet** (Desloratadine 5 mg) every other day is recommended.

Contraindication

Deslona is contraindicated in patients who are hypersensitive to this medication or to any of its ingredients or to Loratadine.

Side Effect

In the recommended doses, undesirable effects with desloratadine are very low. The frequent side effects include fatigue, dry mouth and headache. Less common side-effects may include dizziness, headache and nausea.

Precaution

In the case of severe renal and hepatic impairment, desloratadine should be used with caution.

Use in Pregnancy & Lactation

Pregnancy Pregnancy Category C. There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Desloratadine should be used in pregnancy only if clearly needed.

Lactation Desloratadine passes into breast milk; therefore a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue desloratadine, taking into account the importance of the drug to the mother.

Drug Interaction

No clinically important drug interaction have been reported.

Pharmaceutical Precaution

Store at a cool and dry place, protect from light. Keep out of reach of children.

Commercial Packaging

Deslona Tablet Each box contains 10x10 tablets in blister strip.

Deslona Syrup Each bottle contains 60 ml syrup.



Manufactured by:
GLOBE PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH.

ডেসলোনো

(ডেসলোরাতাডিন আই এনএন)

উপস্থাপন

ডেসলোনো ট্যাবলেট প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে ডেসলোরাতাডিন আইএনএন ৫ মিগ্রা।

ডেসলোনো সিরাপ প্রতি ৫ মিলি সিরাপে রয়েছে ডেসলোরাতাডিন আইএনএন ২.৫ মিগ্রা।

বর্ণনা

ডেসলোনো কার্যকরী, দীর্ঘস্থায়ী, নন-সিডেটিভ এন্টিহিস্টামিন যা সিলেকটিভ এবং পেরিফেরাল এইচ₁-রিসেপ্টর এন্টাগনিস্ট। এটি লোরাতাডিন এর সক্রিয় ডেসকার্বোইথক্সির মেটাবলাইটস।

নির্দেশনা এবং ব্যবহারবিধি

এলার্জিক রাইনাইটিস ডেসলোনো এলার্জিক রাইনাইটিস (সিজনাল এবং পেরিনিয়াল) এর ন্যাজাল এবং নন-ন্যাজাল উপসর্গে নির্দেশিত। ক্রনিক ইডিওপেথিক আর্টিকারিয়া: ডেসলোনো ক্রনিক ইডিওপেথিক আর্টিকারিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের চুলকানি, হাইবস এর সংখ্যা এবং হাইবসের আকার হ্রাসে নির্দেশিত।

সেবনবিধি

১২ বছর বা তার অধিক বয়স্কদের ক্ষেত্রে

ট্যাবলেট: ১ টি ট্যাবলেট (৫ মিগ্রা) দিনে ১ বার।

সিরাপ: ২ চামচ (১০ মিলি) দিনে ১ বার।

৬-১১ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে

সিরাপ ১ চামচ (৫ মিলি) দিনে ১ বার।

১-৫ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে

সিরাপ: ১/২ চামচ (২.৫ মিলি) দিনে ১ বার।

৬-১১ মাসের শিশুদের ক্ষেত্রে

সিরাপ: ১/২ চামচ (২.৫ মিলি) দিনে ১ বার।

অথবা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

যে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক রোগীর যকৃত এবং বৃক্কের অসমকার্যকারিতা রয়েছে: প্রাথমিক মাত্রা হিসেবে একদিন পরপর ১ টি করে ডেসলোনো ৫ মিগ্রা ট্যাবলেট নির্দেশিত।

প্রতিনির্দেশনা

যে সকল রোগী এই ঔষধ বা এর যে কোন একটি উপাদান অথবা লোরাতাডিনের প্রতি অতিসংবেদনশীল, তাদের ক্ষেত্রে ডেসলোনো প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

নির্দেশিত মাত্রায় ডেসলোরাতাডিনের অপ্রত্যাশিত ক্রিয়া অনেক কম। সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে শুষ্কমুখ এবং মাথাব্যথা। স্বল্পসাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বিমূর্নি, মাথাব্যথা এবং বমিবমি ভাব হওয়া।

সতর্কতা

যকৃত এবং বৃক্কের সমস্যায় ডেসলোরাতাডিন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায়: প্রেগনেসী ক্যাটাগরি সি। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ডেসলোরাতাডিনের কোন পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশিত হলে ডেসলোরাতাডিন গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত।

স্তন্যদানকালে

ডেসলোরাতাডিন মাতৃদুধে নিঃসৃত হয় তাই স্তন্যদানকালে ডেসলোরাতাডিন ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

ঔষধের আন্তঃক্রিয়া

ক্লিনিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ ড্রাগ ইন্টারাকশনের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সংরক্ষণ

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

বাণিজ্যিক মোড়ক

ডেসলোনো ট্যাবলেট প্রতিটি বক্সে রয়েছে ১০x১০ ট্যাবলেট ব্লিস্টার স্ট্রিপে।

ডেসলোনো সিরাপ প্রতিটি বোতলে রয়েছে ৬০ মিলি সিরাপ।



প্রস্তুতকারক

গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস লি:
বাংলাদেশ