

## ট্রাইসল বোলাস

গবাদি প্রাণির কলিজাকুমি ও গোলকুমি নাশক

(প্রাণি চিকিৎসায় ব্যবহার)

### উপস্থাপনা :

প্রতিটি ট্রাইসল বোলাস-এ রয়েছে ট্রাইক্লাবেডজল আই এন এন ১০০ মি.গ্রা.।  
এবং লেভমিসল বিপি বেস ৬০০ মি.গ্রা.।

### নির্দেশনা :

ইহা কলিজাকুমি ও গোলকুমি নাশক হিসাবে অত্যন্ত কার্যকরী।  
ফেসিওলা হিপটিকা ও ফেসিওলা জাইগেনটিকা দ্বারা সৃষ্টি সব ধরণের  
কলিজাকুমি জনিত রোগ এবং পাকস্থলী ও অন্তনালীর প্রধান প্রধান  
গোলকুমি হেমনকাস, অস্টারটেজিয়া, কুপারিয়া,  
ট্রাইকেন্ট্রানজাইলাস, বুনোষ্টেসাস, ইসোফেগাটোসাস, বুনোচিঠোনাস,  
ইসোফেস্টেসাস, ট্রাইচুরিস, ডিকটাইওকলাস প্রভৃতি অজাতির চিকিৎসায়  
ইহার কার্যকারিতা অপরিসীম।

### প্রয়োগবিধি ও মাত্রা :

প্রতি ৭৫ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১টি বোলাস প্রয়োগ করতে হবে  
অথবা নিম্নের নির্দেশনামা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

দৈহিক ওজন	বোলাস সংখ্যা
১০-২০ কেজি	১/৪ টি বোলাস
২১-৪০ কেজি	১/২ টি বোলাস
৪১-৭৫ কেজি	১ টি বোলাস
৭৬-১৫০ কেজি	২ টি বোলাস
১৫১-২২৫ কেজি	৩ টি বোলাস
২২৬-৩০০ কেজি	৪ টি বোলাস
৩০১-৩৭৫ কেজি	৫ টি বোলাস

ট্রাইসল বোলাস পানিতে গুলিয়ে কিংবা কোন খাবারের সাথে সরাসরি  
মুখে খাওয়াতে হবে। ইহা প্রাণির দেহে অত্যন্ত সহজীয়। ট্রাইক্লাবেডজল  
নির্ধারিত মাত্রার প্রায় ১৬ গুণ এবং লেভমিসল নির্ধারিত মাত্রার প্রায় ৩  
গুণ পর্যন্ত নিরাপদ মাত্রা রয়েছে।

### বিপরীত নির্দেশনা :

ট্রাইসল এর কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই। অন্য যে কোন রোগের চিকিৎসা  
চলাকালীন সময়েও ইহা ব্যবহার করা যায়। ইহা দ্বারা চিকিৎসা শেষ হবার  
২৮ দিন পর্যন্ত উক্ত প্রাণির মাংস এবং ১০ দিন পর্যন্ত দুঃখদানকারী গাঢ়ির  
দুধ পান না করা যেয়। খাওয়ানোর পর প্রাণিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান  
করাতে হবে।

### সংরক্ষণ :

আলো থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন।

শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন।

### সরবরাহ :

৫ X ৪ টি বোলাস একটি বাস্তু।

### প্রস্তুতকারক:

Globe ফ্লোর ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ  
প্রাণি বাস্তু বিভাগ  
নেয়াবাজার, বাংলাদেশ