

Ultradin-150 (Ranitidine Hydrochloride)

PRESENTATION:

Ultradin-150 : Each film-coated tablet contains Ranitidine 150 mg as Ranitidine Hydrochloride USP.

INDICATIONS :

Ultradin-150 is indicated for the treatment of duodenal ulcer, benign gastric ulcer, post-operative ulcer, reflux esophagitis, Zollinger-Ellison syndrome and in other conditions where reduction of gastric secretion and acid output is beneficial.

DOSAGE AND ADMINISTRATION :

Adult, Benign gastric and duodenal ulcer: Ultradin-150 mg twice daily up to 4 weeks.

Reflux oesophagitis: Ultradin-150 mg twice daily up to 8 weeks.

CONTRAINDICATIONS :

It is contraindicated for patients known to have hypersensitivity to ranitidine.

SIDE EFFECTS:

Headache, skin rashes, dizziness, hypersensitivity reactions, reversible mental; confusion, leucopaenia and thrombocytopaenia have occurred rarely in patients and have reversed on drug withdrawal.

PRECAUTIONS:

Should be given with caution in patients with impaired renal and hepatic function.

PREGNANCY AND LACTATION:

Ranitidine should be used during pregnancy and lactation if considered essential.

PHARMACEUTICALS PRECAUTION:

Store in a cool, dry place. Keep out of the reach of children.

PACKING :

Ultradin-150 : Each box contains 10X10's tablets in Alu-Alu blister pack.

Manufactured by:



Globe Pharmaceuticals Ltd.
Noakhali, Bangladesh.

আলট্রাডিন-১৫০ (রেনিটিডিন হাইড্রোক্লোরাইড)

উপস্থাপনা :

আলট্রাডিন-১৫০ : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে ১৫০ মিগ্রা রেনিটিডিন যা রেনিটিডিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি হিসাবে আছে।

ব্যবহার :

আলট্রাডিন ব্যবহার করা হয় ডিওডেনাল আলসার, বিনাইন গ্যাস্ট্রিক আলসার, অপারেশন পরবর্তী আলসার, রিফ্লাক্স ইসোসোফেগাইটিস, জোলিনগার ইলিশন সিনড্রম এবং অন্যান্য লক্ষণ যেখানে এসিডিটি কমলে ভালো হয়।

সেবনমাত্রা ও বিধি :

বিনাইন গ্যাস্ট্রিক এবং ডিওডেনাল আলসার : আলট্রাডিন-১৫০ মিগ্রা দিনে দুই বার ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত।

রিফ্লাক্স ইসোসোফেগাইটিস : আলট্রাডিন- ১৫০ মিগ্রা দুই বার ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত।

প্রতি নির্দেশনা :

যে সব রোগীর রেনিটিডিন এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ দেওয়া যাবে না।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া :

মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, অতিসংবেদনশীল লক্ষণ, বহুমুখী মানসিক বিভ্রম, শ্বেত কনিকা স্বল্পতা এবং অনুচক্রিকা স্বল্পতা দেখা যায় কখনো কখনো।

গর্ভাবস্থায় ব্যবহার :

এই ওষুধ গর্ভবতী ও দুগ্ধদান কালে শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় অবস্থায় দেওয়া যেতে পারে।

সাবধনতা :

যে সমস্ত রোগীর বৃক্ক এবং যকৃতে সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

ফার্মাসিউটিক্যালস্ সতর্কতা :

ঠান্ডা ও গুরু স্থানে, আলো থেকে দূরে এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

বাণিজ্যিক মোড়ক :

আলট্রাডিন-১৫০ : প্রতিটি বাণিজ্যিক মোড়কে রয়েছে ১০ X ১০ টি ট্যাবলেট এ্যান্ড এ্যান্ড ব্লিস্টার স্ট্রীপে।

প্রস্তুতকারক:



গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
নোয়াখালী, বাংলাদেশ